

Tutorat Les Nuits Blanches

2023/2024

Semestre 3

Promo 2022/2025

**UEC 9 – Pédiatrie
Partiel Blanc**

✿

Tuteur Rédacteur

Sourd Dorian

✿

Référent Pôle partiel 2A

Sourd Dorian

✿

Durée : 20 minutes

Accepte les défis afin que tu puisses ressentir l'euphorie de la victoire.

G.S.Patton

L'organisation des soins en pédiatrie

QCM 11 - 1 :

- A. La vie embryonnaire fait partie de la vie intra-utérine et s'étend du 2^e trimestre au 3^e trimestre de la grossesse.
- B. La vie néonatale se divise en première enfance et deuxième enfance. Elle s'étend de J0 à J28.
- C. Le médecin de la Protection Maternelle Infantile peut suivre les enfants de 0 à 6 ans.
- D. Le carnet de santé est vendu par l'officier d'état civil à la famille au moment de la déclaration de l'enfant à la naissance.
- E. Certains soins peuvent être délivrés à un enfant mineur sans le consentement parental.

QCM 12 - 1 :

- A. L'objectif de la Protection Maternelle Infantile (PMI) est de réduire la mortalité infantile.
- B. Un médecin de PMI exerce des actions de prévention notamment en dépistant des troubles physiques.
- C. Un médecin de PMI exerce des actions de prévention notamment en dépistant des troubles sensoriels.
- D. Le service de promotion de la santé en faveur des élèves peut mettre en œuvre un Projet d'Accueil Individualisé (PAI) pour un élève.
- E. Un PAI, pour Projet d'Apprentissage Intermittent, sert à un élève en difficulté d'avoir l'autorisation de s'absenter lors d'activités incompatibles avec sa pathologie.

Croissance et puberté

QCM 13 - 1 :

- A. 4 hormones permettent la croissance de l'enfant : les hormones de croissance, les hormones thyroïdiennes, les hormones sexuelles et les hormones atropiniques.
- B. 4 facteurs sont impliqués dans la croissance : les hormones, l'alimentation, les gènes et les facteurs psycho-affectifs.
- C. Une courbe de croissance s'interprète grâce à une courbe de poids.
- D. Il existe un consortium entre les pays sur les courbes de croissances, elles comportent les mêmes valeurs de croissance quel que soit le continent.
- E. Un enfant avec qui on ne communique aura plus de risque d'avoir un retard de croissance.

QCM 14 - 1 :


- A. La taille moyenne à la naissance est de 50cm et la taille moyenne à un an est de 75cm
- B. Le mètre est atteint à 5 ans.
- C. La taille moyenne des femmes est de 170cm et celle des hommes de 177cm.
- D. La définition de la puberté chez l'homme se fait en fonction de la pilosité alors que chez la femme c'est le développement des seins.
- E. L'âge osseux des filles est de 11ans alors que celui des garçons est à 13ans.

Le nouveau-né normal

QCM 15 - 1 :

- A. Le score d'Apgar est un score d'adaptation à la vie intra-utérine qui prend notamment en compte la fréquence cardiaque.
- B. Une naissance à terme est définie comme une naissance survenant entre la 37^e semaine et la 41^e Semaine d'Aménorrhée (SA) révolue.

- C. Un extrême prématuré (avant 22 SA) pesant moins de 500g n'est pas pris en charge.
- D. Le Retard de Croissance Intra-Utérin (RCIU) peut être associé ou non à un petit poids de naissance.
- E. Cas clinique : Mathis est né à 35 SA avec un poids de naissance à -4 Déviation Standard (DS) des valeurs de référence. Sa courbe de croissance est celle en trait plein sur le schéma ci-contre.
On peut considérer que Mathis présente un RCIU.



International SGA Advisory Board Consensus. Pediatrics 2003 et 2007

QCM 16 - 1 :

- A. Le test de GUTHRIE permet de dépister une phénylcétonurie sur papier buvard.
- B. Les réflexes archaïques ne plus présents à partir 6 mois.
- C. Le tiré assis est un examen qui consiste à tester le tonus musculaire axial.
- D. La fermeture de la fontanelle antérieure se fait dans 90% des cas entre la 4^e semaine et la 7^e semaine de vie extra-utérine.
- E. Le nouveau-né normal dort en moyenne 16 heures par jour sans périodicité jour-nuit.

Développement psychomoteur de l'enfant de 0 à 6 ans

QCM 17 - 1 :

- A. La préhension est volontaire à partir de 4 mois.
- B. Les réflexes de parachutes sont des réflexes archaïques.
- C. En périphérie, le nouveau-né est hypotonique en flexion ce qui fait qu'ils arrivent à se mordre le pied facilement. Cette hypotonie devient ensuite hypertonique et cette capacité disparaît.
- D. A 9 mois, le nourrisson peut réaliser une pince pouce-index.
- E. Un nourrisson (29^e jour – 2 ans) peut passer à la station debout sans passer par la station « 4 pattes ».

QCM 18 - 1 :

- A. L'enfant commence à comprendre les mots avant de les dire.
- B. A 6 mois à lieu le phénomène de babillage.
- C. Les premiers mots arrivent à 6 mois.
- D. A 24 mois, si un nourrisson n'associe pas les mots, cela constitue un signal d'alerte.
- E. Si un enfant ne marche pas à partir de 24 mois, cela constitue un signal d'alerte. Avant 24 mois il s'agit d'un retard fonctionnel.

Principales pathologies chez l'enfant

QCM 19 - 1 :

- A. La mortalité infantile est le nombre d'enfant mort-nés.
- B. La France se place en tête du classement mondial avec un faible taux de mortalité infantile.
- C. La Mort Inattendue du Nourrisson (MIN) est toujours expliquée contrairement à la Mort Subite du Nourrisson (MSN).
- D. La vaccination n'apporte pas d'effet protecteur contre la MIN.
- E. Le monitoring à domicile (caméra + micro) n'est pas indiqué par l'Académie Américain de Pédiatrie (AAP).

QCM 20 - 1 :

- A. Les éruptions morbilliformes sont le plus souvent virales.
- B. La varicelle est une éruption scarlatiniforme.
- C. La rougeole apporte un risque important d'encéphalite sub-aigu non curable et mortel.
- D. La coqueluche a la particularité de provoquer des accès de quintes caractéristiques.
- E. Depuis 2018, 11 vaccins sont obligatoires.