

Tutorat Les Nuits Blanches

2023/2024

Semestre 4

Promo 2022/2025

**UECP 17 – Psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent
Partiel Blanc**

•

Tuteur Rédacteur

Sourd Dorian

•

Référent Partiel

Sourd Dorian

•

Durée : 20 minutes

Introduction aux troubles de l'humeur de l'enfant et de l'adolescent

QCM 1

- A. Un nourrisson peut présenter une dépression
- B. La dépression chez l'adolescent touche environ 5% de la population
- C. Un Episode Dépressif Caractérisé (EDC) met en jeu des symptômes dépressifs qui durent dans le temps avec une rupture avec l'état antérieur.
- D. La dépression est un facteur de risque de suicide
- E. Le degré d'élaboration du scénario suicidaire est corrélé au degré d'urgence de prise en charge

Troubles anxieux et troubles liés aux stressseurs et aux traumatismes chez l'enfant et l'adolescent

QCM 2

- A. La prévalence globale des troubles anxieux chez l'enfant et l'adolescent est estimée entre 5 et 10 %
- B. Le sex ratio est de 1 pour 1 concernant les troubles anxieux
- C. Les peurs relèvent du pathologiques et sont synonymes de troubles du développement chez l'enfant
- D. L'anxiété sociale est définie lorsque la durée des symptômes associées est supérieure à 6 mois
- E. Les antidépresseurs sont un moyen thérapeutique dans la prise en charge du Trouble Anxieux Généralisé (TAG)

QCM 3 – La triade psycho-traumatique de l'enfant comprend

- A. Des symptômes de répétition
- B. Une phobie sociale
- C. Des manifestations d'évitement
- D. Une hyperactivité neurovégétative
- E. Aucune de ces propositions

Schizophrénie de l'adolescent

QCM 4

- A. Pendant une phase de psychose, il est inutile d'essayer de raisonner l'enfant car il est anosognosique
- B. Un discours désorganisé est un des symptômes pouvant signer une schizophrénie
- C. Une aboulie est un des symptômes pouvant signer une schizophrénie
- D. La schizophrénie hébéphrénique comporte des symptômes à prédominance délirantes
- E. Le barrage est un trouble de l'expression du langage

QCM 5

- A. Le syndrome de référence est le fait de penser que les autres et les éléments de la réalité extérieurs parlent de soi.
- B. Le tabac est la comorbidité addictive la plus fréquente
- C. Il y a une rémission complète à 25% de la schizophrénie sur le long terme
- D. Le délire est fréquent avant 10 ans
- E. Le cannabis est un facteur de décompensation de la schizophrénie

Les troubles neurodéveloppementaux

QCM 6 – Concernant les Troubles du Spectre Autistique

- A. Les TSA sont des troubles du neurodéveloppement
- B. Les TSA touchent environ 1% de la population générale
- C. Les principaux signes d'alertes orientant vers un TSA sont des déficits
- D. Les troubles du sommeil sont très fréquents dans le TSA
- E. La douleur est très fréquente dans le TSA

QCM 7 – Concernant les Troubles du Déficit de l'Attention avec ou sans Hyperactivité (TDA/H)

- A. Les TDA/H possèdent 3 signes majeurs : Difficulté à maintenir son attention, hyperactivité et agissement sous l'impulsivité
- B. Les TDA/H possèdent 4 signes majeurs : Difficulté à maintenir son attention, hyperactivité, agissement sous l'impulsivité et repli autistique
- C. Le TDA/H touche plus les garçons que les filles
- D. Le diagnostic se fait à partir d'un scanner cérébral
- E. Il peut se compliquer de troubles anxieux

Pathologies psychiatriques de la grossesse et du post-partum, interaction précoces parents-bébé

QCM 8

- A. La dépression du post-partum concerne 15 à 20% des femmes
- B. En cas de trouble dépressif, la psychothérapie est en première intention
- C. Baby blues et dépression du post-partum sont synonymes
- D. Le bébé est aveugle à la naissance
- E. L'attachement secure correspond à une attitude d'un bébé ayant peu d'échanges affectifs durant le jeu

Anorexie mentale à l'adolescence

QCM 9

- A. Les TCA concernent différentes pathologies comme la boulimie
- B. L'anorexie mentale évolue souvent vers la boulimie
- C. Plus de femmes sont atteintes de TCA que d'homme
- D. La peur intense de prendre du poids est un critère diagnostique de l'anorexie
- E. L'environnement socio-culturel joue un rôle dans la survenue de TCA

Troubles des conduites instinctuelles de la petite enfance

QCM 10

- A. Un cycle de sommeil dure environ 90 à 100 minutes
- B. Les parasomnies sont des cauchemars à répétition
- C. L'encoprésie correspond à des pertes urinaires diurnes
- D. Il existe une médication seulement pour l'énurésie par constipation.
- E. L'adaptation de l'horaire du coucher en fonction de la fatigue de l'enfant est une méthode permettant d'améliorer la qualité du sommeil