



# TUTORAT Les Nuits Blanches



2023/2024

Semestre 4

Promo 2022/2025

UECP 17 Psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent  
Correction des Annales



Durée : 20 minutes

**QCM 1 : Concernant la schizophrénie de l'adolescent :**

A. Les formes précoces sont associées à une sévérité moindre

**Faux : justement, plus la maladie est précoce plus la sévérité est importante.**

B. Les critères diagnostiques sont différents de l'adulte

**Vrai**

C. Plus on dépiste tôt la schizophrénie, meilleur est le pronostic

**Vrai**

D. Les traitements médicamenteux sont à éviter

**Faux : les traitements, plus précisément les antipsychotiques, sont à prendre sur le long cours, ils sont très importants.**

E. Le cannabis aurait un effet neuroprotecteur

**Faux : au contraire c'est un facteur de risque de développer la maladie.**

**QCM 2 : Concernant la clinique des troubles anxieux chez l'enfant :**

A. L'anxiété peut se manifester par un syndrome physique, mental et comportemental

**Vrai**

B. Des plaintes somatiques font souvent partie du tableau clinique

**Vrai**

C. Manifestations d'anxiété aiguës (sous forme d'attaques de panique) et chroniques cohabitent rarement chez un même enfant

**Vrai**

D. L'expression de la peur est rarement comportementale chez l'enfant

**Faux : l'expression de la peur chez l'enfant peut se manifester par des pleurs, des crises de colère, une impression d'être paralysé... Ce sont toutes des manifestations comportementales.**

E. Le noyau des troubles anxieux est constitué par l'anticipation d'une menace et par l'évitement

**Vrai**

**QCM 3 : A propos des compétences du bébé :**

A. Les bébés communiquent à partir de l'âge de 6 mois

**Vrai**

B. Le bébé a la capacité de reconnaître précocement l'odeur du lait maternel.

**Vrai**

C. Le toucher est une composante majeure de l'expérience précoce des bébés

**Vrai**

D. Les bébés ont une préférence pour la voix de leurs parents

**Vrai**

E. Toutes les réponses précédentes sont vraies

**Vrai**

**QCM 4 : A propos de la schizophrénie chez l'enfant :**

A. Les hallucinations sont le symptôme le plus fréquent

**Vrai**

B. La forme de violence la plus fréquente est l'auto-agressivité

**Vrai**

C. L'intervention d'orthophonistes et de psychomotriciens sera souvent nécessaire

**Vrai**

D. La scolarité devra être adaptée

**Vrai**

E. Le traitement médicamenteux devra être pris au long cours

**Vrai**

**QCM 5 : Font partie des troubles neurodéveloppementaux :**

A. Le trouble du développement intellectuel

**Vrai**

B. La maladie de Gilles de la Tourette

**Faux**

C. La dépression du jeune enfant

**Faux**

D. La dysphasie

**Vrai**

E. La dyslexie

**Vrai**

**QCM 6 : Quels sont les critères de diagnostic de l'anorexie mentale selon le DSM (Classification internationale des troubles mentaux) :**

A. Amaigrissement consécutif à une restriction des apports énergétiques

**Vrai**

B. Peur intense du prendre du poids ou de devenir gros

**Vrai**

C. Aménorrhée

**Faux : il ne fait pas parti des critères mais est un des symptômes de l'anorexie.**

D. Altération de perception du poids ou de la forme du corps (dysmorphophobie)

**Vrai**

E. Altération de la perception de la gravité de la maigreur

**Vrai**

**QCM 7 : A propose des interactions précoces :**

A. Elles commencent dès la grossesse

**Vrai**

B. Elles impliquent uniquement les parents et non le bébé

**Faux : elles impliquent les parents et le bébé.**

C. Elles jouent un rôle majeur dans le développement du bébé

**Vrai**

D. La sensibilité correspond à la capacité à lire les signaux envoyés par le bébé

**Vrai**

E. Le langage est l'unique manière de communiquer avec un bébé de moins de 3 mois

**Faux : il existe aussi la communication visuelle, le toucher...**

**QCM 8 : Concernant le suicide chez l'enfant et l'adolescent :**

A. Plus le jeune a élaboré un scénario plus l'urgence est élevée

**Vrai**

B. Avoir un parent alcoolique est un facteur de risque

**Vrai**

C. Après une tentative de suicide chez un adolescent on retrouve toujours un trouble dépressif

**Faux : l'épisode dépressif ne se retrouve pas toujours mais il est récurrent.**

D. Les troubles anxieux sont un facteur de risque

**Vrai**

E. Le facteur précipitant est la cause du suicide

**Vrai**

**QCM 9 : Concernant le TDAH (Trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité) :**

A. Il ne peut être diagnostiqué qu'à l'âge adulte

**Faux : les facteurs sont précoces (entre 3 et 6 ans) et le diagnostic est souvent réalisé à l'école élémentaire.**

B. Il comprend toujours une hyperactivité

**Faux : souvent c'est le cas, mais dans 45% des cas il y a seulement un symptôme d'inattention.**

C. Il peut se compliquer de troubles anxieux

**Vrai**

D. Il est souvent associé à un autre TND (Trouble neurodéveloppemental)

**Vrai**

E. Les psychostimulants ne sont pas un traitement systématique

**Faux : il y a pléthore d'autres moyens pour traiter les TDAH.**

**QCM 10 : Dans la dépression de l'adolescent :**

A. L'irritabilité est un symptôme fréquent

**Vrai**

B. Le risque suicidaire est faible

**Faux : il est élevé.**

C. Les antidépresseurs sont le traitement de 1ère intention

**Faux : la psychothérapie est le traitement de première intention.**

D. Un des risques est la prise de toxiques

**Vrai**

E. Les manifestations d'anxiété sont fréquemment associées

**Vrai**