

# Tutorat Les Nuits Blanches

2023/2024

Semestre 4

Promo 2022/2025

**UECP 29 – Pathologies endocriniennes et gynécologiques  
Partiel Blanc**

✿

Tuteur Rédacteur

*Pey Clarisse*

✿

Référent Partiel

*Sourd Dorian*

✿

Durée : 20 minutes

## Les pathologies gynécologiques chroniques

### QCM 1

- A. L'endométriose regroupe 4 types de douleurs essentiellement : les dysménorrhées, les dyspareunies, les dyschésies et les dysuries
- B. Il n'existe aucune intervention chirurgicale pour traiter les nodules d'endométriose
- C. L'adénomyose c'est la présence de tissu endométrial la cavité abdominale
- D. Un fibrome peut se transformer en sarcome
- E. Des ménorragies & métrorragies peuvent être à l'origine de fibrome utérin

## Les pathologies gynécologiques aiguës

### QCM 2

- A. Toute douleur pelvienne chez une femme en âge de procréer est une GEU jusqu'à preuve du contraire
- B. La GEU met en jeu le pronostic vital à cause du risque d'hémopéritoine pouvant entraîner un choc hémorragique
- C. Le dosage des béta HCG (<10 000) est le seul critère qui détermine l'introduction d'un traitement médicamenteux par méthotrexate
- D. Des douleurs pelviennes brutales, intenses et résistantes aux antalgiques font évoquer une torsion d'annexe
- E. La kystectomie peut être réalisée sans contrainte de temps

## Les pathologies gynécologiques infectieuses

### QCM 3

- A. Les vulvo-vaginites sont les seules infections génitales basses
- B. Un toucher vaginal douloureux reflète une infection génitale haute
- C. L'endométrite et la salpingite font partie des infections génitales hautes non compliquées
- D. Gonocoque et Chlamydia sont les principaux germes en lien avec des IST à l'origine de ces IGH
- E. Le traitement médicamenteux repose sur une antibiothérapie par trithérapie

## La thyroïde

### QCM 4

- A. Elle est accolée à l'œsophage à la base du cou entre les muscles sterno-cléido-mastoïdiens.
- B. La TSH est l'hormone qui régule la sécrétion d'hormones thyroïdiennes.
- C. En cas d'hypothyroïdie, la TSH est basse.
- D. Un goître est révélateur d'une hyperthyroïdie.
- E. La maladie de Basedow est l'étiologie la plus fréquente d'hypothyroïdie.

## Les surrénales

### QCM 5

- A. L'examen de référence pour observer les surrénales est le scanner.
- B. Les glandes surrénales sont issues d'un précurseur commun : le cholestérol.
- C. La corticosurrénale sécrète les hormones du stress aigu : les catécholamines.
- D. Les androgènes sont des hormones masculines uniquement.

- E. Le syndrome de Cushing est l'affection principale d'un hypercorticisme

## **L'hypophyse**

### QCM 6

- A. C'est une glande composée de 2 parties : l'anté-hypophyse et la post-hypophyse
- B. L'anté-hypophyse représente le chef d'orchestre de la sécrétion hormonale avec 5 groupes différents d'hormones
- C. La post-hypophyse sécrète l'ADH et l'ocytocine
- D. L'axe somatotrope est dirigé par les cellules somatotropes qui sécrètent l'ACTH
- E. L'insuffisance antéhypophysaire regroupe uniquement l'insuffisance thyroïdienne et corticotrope

## **L'examen clinique sénologique**

### QCM 7

- A. Une mastodynie est motif de consultation pour une patiente
- B. La palpation doit se faire avant l'inspection
- C. L'écoulement mamelonnaire est recherché lors de la palpation
- D. Les anomalies ne sont détectables que lors de la palpation
- E. L'auto examen doit être réalisé 1 fois par semaine pour être efficace

## **La grossesse physiologique**

### QCM 8

- A. 95% des grossesses sont dites « normales ».
- B. La 1<sup>ère</sup> consultation s'effectue vers le 1<sup>er</sup> trimestre.
- C. Le dépistage de la trisomie 21 est obligatoire lors de la 3<sup>ème</sup> semaine.
- D. Le suivi de grossesse comporte 7 consultations obligatoires ainsi que 3 échographies recommandées.
- E. Les sérologies de toxoplasmose et rubéole sont recherchées de manière obligatoire au cours des 3 premiers mois.

## **Les grossesses pathologiques**

### QCM 9

- A. L'hémorragie génitale au 1<sup>er</sup> trimestre concerne 1 grossesse sur 4.
- B. Le placenta accréta représente un des 2 diagnostics d'urgence d'hémorragie génitale au cours des 2<sup>èmes</sup> et 3<sup>èmes</sup> trimestres.
- C. Une hypertension artérielle gravidique associée à une protéinurie correspond à la définition de la prééclampsie.
- D. Il y a uniquement des causes infectieuses à l'origine d'une MAP.
- E. La perte des eaux entraîne dans la majorité des cas un accouchement prématuré dans les 7 jours suivant la rupture des membranes.